

# NOTFÄLLE BEIM PFERD

24h Notdienst  
Tel: 041 871 32 32

## 1. KOLIK

Mögliche Symptome:

Die Symptome bei Kolik können vielfältig sein: Appetitlosigkeit bis hin zur völligen Futterverweigerung, Niederlegen, Festliegen, Wälzen, Umsehen nach dem Bauch, Scharren, Schwitzen, Unruhe, beschleunigte Atmung, häufiger Harnabsatz. Aber auch Müdigkeit, auffallend „ruhiges“ Verhalten und längeres Liegen können auf Kolik hindeuten. Bei sehr hochgradiger Kolik kann es auch zum Einnehmen unnatürlicher Stellungen bis hin zum rücksichtslosen „Sich-Hinwerfen“ kommen.

Achtung: Pferd kann unkontrollierte Bewegungen machen -> langer Strick und vorsichtiges Handling!

**Eine Kolik ist immer ein Notfall! Bitte umgehend Tierarzt anrufen!**

Erstversorgung durch den Pferdebesitzer:

- Kontinuierliche Beobachtung
- Futter wegnehmen, Wasser darf aufgenommen werden
- Ideal ist in den meisten Fällen leichte Bewegung, z.B. Schritt führen, frei bewegen und evtl. wälzen lassen
- Falls das Pferd nur sehr ruhig ist und nichts frisst → Körpertemperatur messen (normal ist 37,5° - 38°)

Mögliche Gedanken bis Tierarzt vor Ort:

- Kommt eine Einlieferung des Pferdes in eine Klinik in Frage, falls dies notwendig ist?
- Für den Fall, dass eine Operation nötig wäre, kommt dies überhaupt in Frage?
- Wie kann das Pferd schnellstmöglich in eine Klinik transportiert werden?
- Falls das Pferd im Stall bleibt: Wie kann das Pferd überwacht werden und von wem?  
Gibt es die Möglichkeit, das Pferd einige Zeit kontinuierlich/regelmäßig zu überwachen – auch in der Nacht?
- Wie war der Kotabsatz/Urinabsatz in den letzten Stunden?
- Besondere Vorkommnisse? Auffällige Verhaltensweisen des Pferdes?

## 2. HOCHGRADIGE LAHMHEIT/FRAKTURVERDACHT

**Das Pferd nicht mehr bewegen und Tierarzt anrufen!**

## 3. VERLETZUNGEN

**Das Pferd nicht mehr bewegen und Tierarzt anrufen!**

Erstversorgung/Abklärungen durch den Pferdebesitzer:

- Blutung stoppen - evtl. Druckverband
- sauberes Wasser bereithalten
- Alter und Lokalisation der Verletzung?
- Tetanus- Impfschutz? (bitte Dokumente bereithalten)

## 4. SCHLUNDVERSTOPFUNG

Mögliche Symptome (meist innerhalb von Minuten während dem Fressen): Speicheln, Würgen, Futterbrei oder Speichel aus Nüstern, Umfangsvermehrung an linker Halsseite, ...

**Futter wegnehmen, Kopf tief halten und Tierarzt anrufen!**

## 5. SCHOCK/KREISLAUFPROBLEME/ATEMNOT

Mögliche Ursachen:

- Grosse Blut-/ Flüssigkeitsverluste
- Massive Infektionen
- Herzinsuffizienz
- Heftige allergisch-/anaphylaktische Reaktionen
- Hitzschlag/Erschöpfungssyndrom

Mögliche Symptome:

Erhöhte Herz- und Atemfrequenz, kühle Körperoberfläche, Apathie, kalter Schweiß, ...

**Ein Schock ist immer ein Notfall! Bitte umgehend Tierarzt anrufen!**

Erstversorgung durch den Pferdebesitzer (falls Schockursache bekannt):

- Bei Verletzung: Blutung stoppen - evtl. Druckverband
- Bei Hitzschlag/Erschöpfungssyndrom: Pferd an schattigen, kühlen Platz bringen und vorsichtige Abkühlung mit kaltem Wasser